

3° *L. vespertina* ♀ × *diurna* ♂ sur une pelouse avoisinant la ligne ferrée de Gilly, à quelques décimètres de *L. vespertina* ♀ et à 100 mètres de la station abondante de *L. diurna*.

On sait que les *Melandrium dubium* Hampe et *M. intermedium* Schur sont nos hybrides, mais naturels, et que certains auteurs les identifient, quand d'autres, en particulier MM. Rouy et Foucaud (1), en font respectivement *L. diurna* ♀ × *vespertina* ♂ et *L. vespertina* ♀ × *diurna* ♂.

Ces dissidences sont évidemment dues aux diagnoses peu précises et incomplètes de Hampe et de Schur.

Qu'on nous permette de conclure que le terrain d'entente à l'avenir est tout indiqué dans les diagnoses détaillées où les caractères des hybrides seront comparés à ceux des parents et où les analogies et les dissemblances seront évaluées le plus judicieusement possible (2).

M. Malinvaud présente à la Société, de la part de M^{lle} Marguerite Belèze, un échantillon de *Lycopodium clavatum*, qu'elle a recueilli, le 23 août dernier, dans des « bruyères montueuses, au-dessus de l'étang du Roi (Forêt de Rambouillet) ».

FLORE DE L'ILE DE LESBOS, par M. Paléologos CANDARGY (3).

Colchicum variegatum L. — In regione montana Olympiæ. — C.

C. variegatum L. forma **decolorans**. — Perigonium extus album superne et intus vix roseo-tesselatum. In monte Zossa Jeræ regionis Olympiæ.

Myogalum nutans Link.

M. prasandrum Walp. — Reg. inf. et mont.

Ornithogalum pyrenaicum L. var. **amblyanthum**. — Perigonii phyllis

(1) Rouy et Foucaud, *Flore de France*, t. III, pp. 95-96.

(2) Notre éminent compatriote, M. le Dr Bornet, dont l'obligeance n'a d'égale que le savoir, a daigné nous fournir les extraits traduits de Gærtner utilisés dans ce travail. Nous saisissons l'occasion qui se présente ici de lui en témoigner publiquement notre vive reconnaissance.

(3) Voy. plus haut, p. 369.

oblongo-linearibus *obtusis*, pallide ochroleucis, filamentis perigonio 2-plo brevioribus apice abrupte acutis. — C.

Ornithogalum pyrenaicum L. var. **trinerve**. — Foliis lateralibus scapo æquilongis, bracteis pedicello subæquilongis, perigonii phyllis trinerviis. — C.

O. umbellatum L. — RR.

Allium leucanthum C. Koch. — Floribus lente roseis. Vulgo *ἀγρία πράσα*. In insula parva Hagios Isidoros sinus Jeræ.

A. sphærocephalum L. — Mons Lepetymnon.

A. sph. β. *viridi-album* Tineo. — Campo Kalloni.

A. descendens Fl. Gr. — Colle Murvet ad pagum Pigi.

A. staticiforme Sibth. et Sm. — In arenis maritimis littoris Kalloni.

A. nigrum L. var. **ochroleucum**. — Omnibus partibus subminor, perigonii phyllis minoribus vel subangustioribus, *ochroleucis* non albo-roseis ut in typo, post anthesin revolutis; filamentis sublongioribus. — In monte Olympo loco Polis dicto ad pagum Agiassos et in colle Melissorachto ad pagum Phylia. — C.

Muscari racemosum Mill. v. **humile**. (= var.? *brachyantha* Boiss.). — Differt a typo perigonio ovato urceolato, dentibus *concoloribus*, perigoniiis sterilibus nullis vel obsoletissimis, scapo humili vel raro mediocri.

Fritillaria pontica Wahl. β. **substipitata**. — Capsula obovata brevissime stipitata apice truncata, perigonio 4-5 cent. longo, foliis caulibus infimis 2 1/2 cent. latis cæteris angustioribus. In regione montana in valle *Andria* et in montibus Petrovuni et Olympo. — C.

Tulipa Orphanidea Boiss. — Mons Petrovuni (Species nova pro Asia).

Gagea bohémica Sch.

G. foliosa β. *micrantha* Boiss.

G. foliosa γ. **subtuberculata**. — Perigonii minoris phyllis glaberrimis bulbis binis, altero minimo lævi vel plus minus tuberculato. Caule et foliis glabris vel parce pilosis. — A varietate præcedenti perigonio glabro 7-9 mm. longo, bulbo altero lævi vel ± tuberculato differt; a *Gagea amblyopetala* perigonii phyllis angustioribus, filamentis perigonii proportionem longioribus. — R.

G. reticulata Pal. — RR.

Asphodelus fistulosus L. — Ad littus Kunturidia sinus Jeræ.

Asphodeline lutea L. — In regione montana Maleæ, Olympi 1100 m., Liacas et in campo et collibus ad Eressos.

A. brevicaulis Bert. — Loco Probatar ad Chydæra.

Smilax aspera L. — In campo Ipios. — C.

Crocus sativus forma **albiflora**.

C. biflorus β . **longitubus**. — Perigonii tubo limbo duplo longiore, laciniis elliptico oblongis obtusis internis albis, externis intus albis extus 3-5 violaceo vittatis vittis sæpius plumosis, cæteris albis aut pallide flavis et vittatis, fauce glabra lutescenti, filamentis puberulis anthera lutea 2-3-plo brevioribus; cætera typi. In colle Udja 230-200 metr. — C.

C. spec. (annulati). — Monte Petrovuni.

Iris ochroleuca L. — Ad littora Kalloni, Sigrion, Ipios, Pamphyla, fluvium Longos Eressi.

Pancratium maritimum L. — Foliis paulo subhysteranthiis, scapo umbellatim 7-13-floro, pedicellis aliis ovario 1 1/2-plo longioribus aliis eo brevioribus bracteolis intermixtis; perigonii tubo limbo sesquiplo longiore. In arenis maritimis Eressi, Sigrii, etc. — C.

Serapias cordigera L.

Orchis papilionacea L.

O. Comperiana Stev. — Reg. mont. Buro, Olympi.

O. coriophora L. var. *fragrans* Boiss. forma α . **integra**. — Labello apice albo-rubroque punctato, lobis integris.

— β . **dentata**. — Labello apice roseo atro rubroque punctato, lobis lateralibus tridentatis.

— γ . **erosa**. — Labello apice albo roseoque punctato, lobis lateralibus eroso-dentatis.

Orchis coriophora var. **rosea**. — Spica subbrevior perigonio semper roseo. — Formæ adsunt. — CC.

— α . **major**. — Labelli lobis lateralibus crenatis.

— β . **vittata**. — Labello viride vittato et roseo punctato.

— γ . **albo-rosea**. — Labello albo-roseo.

— δ . **punctata**. — Labello roseo et rubro-punctato nec non viridivittato.

O. tridentata Scop. — Caule humili, floribus odoratis minoribus roseo-albis; cætera sequentis. Campo Lecerda, Olympus, etc.

O. tridentata. — Spica ovata vel oblonga, floribus roseis odoratis, majoribus labio trifido, lobis integris subæqualibus, calcare ovario æquilongo. In Olympo, Buro, etc.

Orchis lactea Poir. — Caule elato, floribus roseis galea brevi. — In colle Anaphani ad Mitylenem.

O. Simia Lamk.

O. anatolica Boiss.

O. palustris Jacq. — In humidis ad littus Ipios.

O. laxiflora Lamk. — Ibidem. Perigonii laciniis exterioribus ovato-oblongis.

Ophrys æstrifera M. B. — Sed tuberibus globosis, phyllis internis obtusis roseis, labello stipitato lobo intermedio ovato.

O. Bertolonii Moretti. — Labello 3-lobo, lobis lateralibus oblongis acutis, medio latissimo convexo, phyllis interioribus oblongo lanceolatis versus basim utrinque uni-truncato-dentatis. — C.

Platanthera bifolia L. — Ad pedes Olympi.

Cephalanthera ensifolia Rich. — Mons Miribili 600-650 metr.

Epipactis atro-rubens Hffm. — Olympus, etc.

Limodorum abortivum L. — Olympus, Petrovuni, etc.

Listera ovata L. — Reg. mont. Olympiæ.

Triglochin Barrelieri Lois. — In paludosis campi Jeræ ad Evriaci.

Ceratophyllum submersum L.

Corylus Avellana L. — Culta et spontanea in Olympo!

Quercus lusitanica Lamk α . *genuina* Boiss. — Vulgo ροπάκια regio mont. Maleæ.

Q. lusitanica β . *Boissieri* A. DC. — Ibidem.

Q. pseudo-coccifera Desf. — Ad pagum Moria, 100 metr.

Q. Cerris L. var. *Pseudo-Cerris* Boiss. — In Oxia-petra et Malathra et Scotino-vuno reg. Lepetymniæ. — Vulgo άγριον δένδρον.

Q. Ægilops L. — Regio Ordymnia et Lepetymnia.

Castanea vulgaris Lamk. — Culta et spont. in Olympo.

Platanus orientalis L. forma *occidentaloides* P. Cand. in *Rev. médico-pharm. Constantinople*, V. 106. — Vulgo θηλυκός πλάτανος.

Parietaria cretica L.

Atriplex hastata L. var. *salina* Wallr. — In Asia minore littorali.

A. patula L. VAR. — In *Rev. méd.-pharm.* V, 107. — C.

A. patula L. var. **sagittata** P. Cand. *loc. cit.*

A. roseum L. VAR. — *Loc. cit.*

Chenopodium Vulvaria L. forma **prostrata** P. Cand. *loc. cit.*

C. opulifolium Schrd. — Novum pro Anatolia. — C.

- C. murale* L. forma **cucullata** P. Cand. *loc. cit.* — R.
- Rumex græcus* Boiss. et Heldr. var. **undulata** P. Cand. *loc. cit.* — In campo Thermni et in una valle Olympi. — C.
- R. crispus* L. — Campo Eressio.
- R. tuberosus* L. forma **circinata**. — Foliis basi in auriculas attenuatas circinatas desinentibus, — R.
- R. acetoselloides* Bal. — Olympus, etc.
- Thesium Bergeri* Zucc. — Prope pagum Hagia Marina.
- Loranthus europæus* L. — Parasit. ad *Quercum infectoriam* in pedibus collis Manulos ad Mandamados.
- Valerianella thelocarpa* P. Cand. *loc. cit.* — Reg. inf. et mont.
- V. metrioloba* P. Cand. *loc. cit.* — Ibidem.
- Cephalaria transylvanica* L. — Ad pagum Mandamados, colle Kalioni, etc.
- Knautia hybrida* All. — Ibidem.
- Eupatorium cannabinum* L. — Humidis ad Asomatos.
- Tripolium vulgare* Nees. — Salsug. paludosis.
- Bellis annua* L. var. *obtusisquama* Pau forma **virescens** P. Cand. et forma **nigrescens** P. Cand. *loc. cit.*
- Inula Lesbiaca* P. Cand. *loc. cit.* — Reg. inf. et sup. — R.
- I. heterolepis* Boiss.
- Pulicaria microclada* P. Cand. *loc. cit.* — Ad Messa prope Kalioni.
- Asteriscus aquaticus* L. — Humidis ad promont. Machæra.
- Cota tinctoria* L. — Reg. mont. Lepetymni.
- C. tinctoria* var. **brachyglossa** P. Cand. *loc. cit.* — Ad Karcavura montis Olympi.
- C. altissima* L. — Ad Mitylenem.
- C. Theophrasti* P. Cand. *loc. cit.* — Mons Lepetymnon 900 metr. et Oxia petra 700 metr.
- Anthemis montana* L. var. *anatolica* Boiss. — Montibus Olympi Petrovuni.
- A. aciphylla* Boiss. γ. **macropoda** P. Cand. *loc. cit.* — Ad Megalimni, 450 metr.
- A. lesbiaca* P. Cand. *loc. cit.* — In reg. inf. et mont. — CC.
- A. lesbiaca* var. **radiata** P. Cand. *loc. cit.* — Ibidem.
- A. arvensis* L.

Anthemis Cotula L. var. α . *typica* et β . **brachyglossa** P. Cand. *loc. cit.* — C.

A. maritima L. — In arenis maritimis.

Matricaria Chamomilla L. β . *coronata* J. Gay. — Ad Perama Jeræ.

Chamæmelum oreades Boiss. var. *Kotschyi* Boiss. — Mons Olympus.

Chrysanthemum coronarium L. forma **ochroleuca**. — Ligulis ochroleucis. — R.

C. coronarium forma **leucoglossa**. — Ligulis albis, basi ochroleucis. — R.

Leucanthemum vulgare L.

Artemisia maritima L. — Paludibus Larissæ.

Phagnalum græcum Boiss.

Helichrysum siculum Sprng. — Ad Kratægos 100 metr. regionis Maleæ.

H. orientale Tourn. — In loco Nissakia promont. Machæra.

Filago spathulata var. *prostrata* Parl.

Doronicum caucasicum M. B. — In umbrosis silvaticis regionis montanæ.

Senecio vernalis W. K. forma **major**. — Caulibus robustioribus capitulis majoribus. — Loco Kilia dicta Jeræ. — R.

Echinops lepetymnicus P. Cand. forma **cyanea**. — Corolla et involucri phyllorumque pars superior cyaneæ. — In monte Lepetymnon et ejus pedibus nec non cum fluviis usque ad campum Kalloni descendens.

Cardopatum corymbosum L. — Corollis albidis dilute cærulescentibus.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm. — In colle Manulos ad Mandamados.

Carlina corymbosa L. var. **lesbiaca** (aff. var. *græcæ* Heldr. et Sart.). — Caulibus floriferis ob folia sicca cito decidua denudatis, involucri phylla externa patula vel recurva angusta, intima glaberrima radiantia 1 1/2-2-plo longiora. Planta glabra vel indumento \pm araneoso vestita (= forma *araneosa*). — In aridis et collibus regionis inferioris. — CC.

Cirsium lanceolatum L. — Campo Ipios.

Chamæpeuce Alpini Jaub. et Spach var. *camptolepis* Boiss. — 0-500 m. — C.

C. Alpini forma **leucocephala**, flosculis albis. — R.

Notobasis syriaca Cass. forma **leucocephala**, flosculis albis. — R.

Onopordon tauricum Willd. var. *elatum* Sibth. *Fl. gr.*

Silybum Marianum L. — Campo Ipios.

— var. *pygmæum* Cass. — In Fabæ Larissæ.

Centaurea Cyanus L. — Reg. mont. et inf.

C. spinosa L. — In littoribus. — C. sed exceptione in regione Eressi adscendens montem Ordymnos. — Vulgo θαλασσοστοιβή.

C. Reuteriana Boiss. — In pinetis inter Micra et Megali Limni (500 metr.). — R.

Microlonchoides pinnatus P. Cand. var. **humilis**. — Caulibus humilibus 0^m,07 foliis brevioribus vel sublongioribus albo-lanatis simplicibus magis lanatis vel valde variabilibus (lyratis, pinnatifido-lyratis); involucri phyllis tenuioribus araneoso-lanatis, inferioribus subreflexis; folii terminalis lacinia linearis oblonga ovata vel lanceolata. In summa montis Petrovuni 700 metr.

Kentrophyllum dentatum Vahl var. **brachypappum**. — Paleis intimis multo brevioribus conniventibus apice truncatis vel acuminatis. — CC.

Cichorium Intybus L. — Caule inferne aspero, superne plus minus glabro, sulcato; foliis caulinis inferioribus runcinatis, sup. nullis; involucri phyllis omnibus *glabris*, flosculis involucri 2-plo longioribus; pappi paleolis minutissimis oblongo-linearibus obtusis erosulis. — C.

Hedypnois cretica L. forma α . **glabra** involucri phyllis glaberrimis.

— β . **subscabra**, phyllis apice tantum remote hispido-setosis.

— γ . **scabra**, phyllis toto dorso hispido setosis.

H. cretica L. *gracilior* Boiss. — Pro Anatolia nova. — R.

Rhagadiolus stellatus DC. β . *leiolaenus* Boiss.

Thrinia hirta Roth.

Helminthia echioides Gärtn.

Tragopogon porrifolius L. forma **flavida**: ligulis supra sordide flavidis, subtus fusco-roseis.

T. longirostris Bisch. β . **hybridus**. — Radix perennis cylindrica crassa; floccosus foliis undulatis; ligulis extus roseis intus sordide flavidis involucri brevioribus; achæniorum rostro apice incrassato.

T. longirostris γ . *brachyphyllus* Boiss.

Podospermum Jaquinianum Koch, involucri phyllis exterioribus intus glabris. — In pinetis Peucôn dictis inter Despotu-Bryssis et Megali-Limni — C.

Seriola aetnensis L. — Reg. mont.

Taraxacum officinale L. var. *laevigatum* Bisch.

Sonchus oleraceus L. β . **dentatus**. — Foliis dentatis et parce lobatis oblongo lanceolatis.

S. oleraceus γ . **roseus**. — Foliis dentatis, capitulis minoribus non floccosis, ligulis albo-roseis.

— δ . **glandulosus** (oleraceo \times glaucescens). — Foliis firmioribus; caulibus superne glandulosis, auriculis foliorum breviter acutis; involucri phyllis glabris vel setosis; achæniis longioribus.

S. tenerrimus L. — Ad Mitylenem. Saxis littoralibus.

Lactuca saligna L. forma **integrifolia**. — Foliis omnibus integerimis inferioribus elongatis linearibus rarius repandis lobulatis vel pinnatifidis et tunc infimis integris. — Ad pagum Aclidiu.

Phœnixopus vimineus L. — Ad Mitylenem.

Ætheorrhiza bulbosa Cass. β . *polycephala* Boiss.

Crepis Reuteriana Boiss.

C. pulchra L.

C. parviflora Desf. var. **glabrescens** plus minus, foliis caulinis breviter sagittatis, involucre minus muricato, ligulis involucre 2-plo longioribus subtus non rubris. — Ad Lapmyli (Ipios).

Barkhausia fœtida L.

B. rubra L. forma **dentata**, foliis dentatis.

B. rubra forma **luteo-rosea**, floribus luteo-roseis.

Pilosella præalta DC. — Reg. inf. et sup. — C.

Lagoseris orientalis Boiss. — R., reg. mont. Olympi, Petrovuni.

Xanthium strumarium L.

Specularia falcata Ten. **forma** foliis superioribus lanceolato-linearibus.

Galium setaceum Lamk **lasiocarpum**. — In monte Oros Jeræ, ad pagum Pigi.

G. nigricans Boiss. forma **antrorsa**. — Foliis antrorsum scabridis, pedicellis glabris fructuque glabro minutissime tuberculato, corolla glabra lobis in setam lobo brevioribus abeuntibus, caule humili 5-17 cent. — Ad Megali Limni, pro Anatolia novum.

G. intricatum Marg. et Reut.

G. caudatum Boiss. β . *chium* Boiss. et Orph. — Corollæ lobis aristis longioribus, fructu papillis setiformibus spinulosis obsito, pedicellis

- fructiferis valde divaricatis non vel subcurvatis, incrassatis. — C.
- Galium caudatum* γ. **lesbiacum**. — Corollæ lobis apiculatis, fructu tenuiter albo-verrucoso, pedicellis post anthesin incrassatis, non vel subcurvatis.
- G. Aparine* L., α. typicum = **trichozon** et β. **gymnozon**, caulibus ad nodos incrassatis *hirsutis* vel subincrassatis *glabrescentibus*, foliis infimis obovatis, cæteris oblongo-lanceolatis vel lanceolatis linearibus superne aculeato-scabris, pedunculis fructiferis divaricatis vel diffusis. — C.
- G. saccharatum* All. **grandifolium** in Dr Candargy, *Flore de l'île de Lesbos* (plantes sauvages et cultivées, 1889, Zürich, p. 41).
- G. Mollugo* L.
- G. cinereum* All. — In monte Petrovuni, et Carpia, Liaca regionis Olympiæ.
- G. elongatum* Presl. — Corollis extus sæpe rubellis. — In Megalimni, campo Kalloni.
- Crucianella angustifolia* L.
- Lonicera etrusca* L. var. *Ræseri* Boiss. — In Manulo et Petrovuni.
- L. etrusca* var. **xylostemoides**. — Foliis junioribus minoribus tenuioribus oblongo-ellipticis et superne molliter hirsutis viride glaucis (facie *Xylostei*) breviter petiolatis, floralibus coriaceis glabrescentibus; scandens. — C.
- L. implexa* Ait. forma **exotricha**. — Corollæ tubus extus puberulus.
- L. implexa* forma **endotricha**. — Corollæ tubus extus glaber, intus ad limbum puberulus, stylus hirtus, foliis sempervirentibus coriaceis. — In campi Jeræ fluvio Ligionas dicto.
- Viburnum Tinus* L. — In fluvio Tinegias et circa pagum Pigi; nec non cultum.
- Sambucus Ebulus* L. — Reg. Malea et ad Karini.
- Fraxinus excelsior* L. — Reg. inf. et sup. Lepetymniæ nec non in Messa. — Vulgo Μελεός.
- Nerium Oleander* **albiflorum**. — Corollis amœne albis vidi spontaneum in campo Kalloni et ad monasterium Limonos unde ubi nec non in urbe Mitylene cultum est.
- Vincetoxicum canescens* L. β. **pedicellatum**. — Brevissime tomentosocanescens pruinose, caulibus brevibus simplicibus, ascendentibus vel patulis, foliis breviter petiolatis, umbellis sessilibus vel pedunculatis ebracteatis vel indefinitis, corollæ virenti-flavidæ laciniis oblongo-triangularibus acuminatis, florum pedicellis eis æquilongis. — In montibus Lepetymnon 600-1070 metr. et Petrovuni.

- Erythræa latifolia* Sm. — Ad pagos Kalamniari et Moria.
- E. Centaurium* β . *laxum* Boiss.
- Gentiana lutea*. — In Olympo. — RR.
- Cuscuta Epithymum* L. — In *Origano Onite*.
- C. europæa* L. — Ad *Galia*, *Umbelliferas*, *Hyperica*, *Odontarrhenam* parasitica.
- C. obtusiflora* H. B. K.
- Datura Stramonium* L. — Campo Ipios.
- Hyoscyamus niger* L. — Ad Mitylenem, in Campia loco dicto Olympi ad pagum Agiassos.
- Solanum Dulcamara* L. β . *indivisum* Boiss. — Spont. ad fluvium Hagios Demetrius, ad locum Karcavura prope pagum Assomati.
- Lavandula cariensis* Boiss. — Capitulis sæpissime longe pedunculatis ovatis vel ovato-oblongis. — Ad pagos Assomati et Messotopos.
- Mentha silvestris* L.
— subspec. *chloreilema* Briq.
- Mentha brachyodonta***. — Dentibus calycinis brevibus ovato-triangularibus acutis ut in *M. Noëana* Boiss. sed ab ea differt: tomento mollissimo crasso denso nec tenui, canescenti; foliis patule plicatis crispulis dentatis nec planis utrinque 2-3 dentatis; verticillastris elongatis tenuiter cylindricis remotis (7-12 cent.), nec remotiusculis brevibus (3-4 cent.), planta 30-40 cent. alta. — Ad pagum Aclidiu. — C.
- M. Noëana* Boiss. — In rivulo Alyssida ad Mitylenem.
- M. tomentosa* D'Urv. — In humidis Fabæ Larissæ; pilis rarissime ramosis.
- Mentha æpycaulos***. — Trichomatis pilis partim simplicibus partim ramosis; foliis subpetiolatis; spicis longis tenuiter cylindricis inferne sæpe interruptis ut in *Mentha tomentosa* sed ab ea differt: calycis dentibus elongatis lanceolato subulatis nec brevibus triangularibus; foliis ad 9 cent., \pm subtus tomento laxo araneosis canescentibus, planis, subintegre denticulatis vel remote pauciserratis foliis haud ad 2 c., tomentosus vel lanatis, tomento crasso nec subplanis plicatis denticulatis margine undulatis, nec non differt spicis ad 15 cent. longis, et præsertim planta circiter 3 m. alta nec $1/2$ m. alta, spicis haud ad 7 cent. longis. — In rivulo Udja 180 m.
- Pulegium vulgare* Mill. var. **erectum**. — Caulibus crassis erectis, foliis oblongis $2\ 1/2$ - $3\ 1/2$ cent. longis, basi in petiolum brevem apiceque attenuatis. Radix fibrosa crassa. — Ad Megali-Limni, Kaloniro (Messa).

Origanum vulgare L. var. *albiflorum* C. Koch.

O. hirtum Vogel. — CC.

a. Bracteis ovatis vel oblongis acutis.

— α . **typicum** (= *Orig. hirtum* sensu Boiss.). — Calyx fructifer bractea ovata longiore; spicis oblongis vel longioribus.

— β . **subtypicum**. — Calyx fructifer bractea ovato-oblonga vel oblonga longiore.

b. Bracteis obovato-rotundatis obtusis.

— γ . **oostachyum**. — Spicis ovato densifloris corymboso-paniculatis, bracteis saltem superioribus obovato-rotundatis obtusissimis.

— δ . **laxiflorum**. — Spicis incompletis haud densifloris cymoso-confertis ovatis, bracteis ut in *macrostachyo* sed acutiusculis; foliis petiolatis summis brevissime petiolatis.

— ϵ . **macrostachyum**. — Spicis elongatis confertis racemoso-paniculatis, bracteis latis obovato-rotundatis obtusissimis infimis acutiusculis, calycis limbo antico profunde brevissime bidentato.

forma **macrostachyoides**. — Differt a var. *macrostachyum* bracteis acutis solum.

— σ . **corymbosum**. — Inflorescentia ampla et laxe corymbosa spicis oblongis longioribusque, bracteis saltem superioribus obovato-rotundatis obtusissimis.

Thymus angustifolius Pers. **albiflorus**. — Inter Megali et Micra-Limni.

Corydothymus capitatus Link et Hffm. **albiflorus**.

Thymbra spicata L.

Micromeria Juliana (L.) Roth.

M. græca Bth.

Calamintha officinalis Mneh.

Zizyphora capitata L. — RR.

Z. taurica M. B.

Rosmarinus officinalis L. **macropodus**. — Cultus, floribus omnibus pedicellatis nec sessilibus, bracteis acutis.

Salvia pinnata L.

S. pomifera L. — RR.

S. argentea L. var. **olympica**. — Ut in typo, sed calycis dente intermedio labii superioris minutissime mucronato, corollæ labio su-

periore cærulescenti, nuculis reticulato-venosis. In summa montis Olympi 1180 metr., et in monte Petrovuni.

Salvia virgata Ait. **latibracteata**. — Specimina parva caule simplice (an *S. nudicaulis*? Koch) nudo racemoso vel bifoliato foliis sessilibus paniculatis, radicalibus pinnatifidis lobatis crenato-dentatis puberulis, caulibus brevibus, verticillastris 4-6 floris breviter pedicellatis bracteis *latis orbiculatis* acutis calyce brevioribus, calycis pilis simplicibus glandulosisque, corollæ cyaneæ labio superiore compresso, staminodia 2 postica minima, calycis labio superiore concavo bisulcato. — In urbe Mitylene. — R.

S. viridis L.

Nepeta alba Desf. — Sed inferne villosula, corollæ tubus extus hispidus ut in parte externa laciniarum, calycis tubus intus glaber, lacinia labii inferioris media hirta. — In summa montis Chalandriæ. Vulgo in pago Anemotia καλαμάθρος seu Calamintha.

Sideritis romana L. var. **æolica**. — Annua, verticillastris ∞ floris distantibus, bracteis spiniformibus nullis, calyx antice gibbus, bilabiatus, labio superiore unidentato dente oblongo acuminato sursum reflexo, inferiore 4-dentato dentibus reflexis a basi triangulari subulato-attenuatis, fauce villosa; nuculis globosis minutissime rugosis. — In reg. inf. et sup. — C.

S. lanata L. (= *S. nigricans* Pers.). — Reg. inf. et sup. Olympiæ.

S. cretica Boiss. non L. — In montibus Petrovuni usque ad summum Olympi.

Lamium striatum Sibth. et Sm. — Reg. Olympiæ Lepetymniæque.

L. amplexicale L. **majus**. — Omnibus partibus robustum. — In hortis. — C.

L. amplexicale **albiflorum**. — R.

L. moschatum Mill. β . *micranthum* Boiss. — Ad pagum Rerma qui est prope pagum Vatussa.

L. purpureum L. — Campo Ipios, Karini, ad ostium fluvii Tinegias.

Stachys salviæfolia Ten. — RR.

S. affinis creticæ. — Corollis albis labio superiore integro.

Ajuga Chamæpitys L.

A. orientalis L. var. **cryptandra**. — Perennis albo et longe lanato virescens, caulibus tetragonis foliis inferioribus petiolatis floralibus sessilibus sublobato inciso-dentatis, calyx profunde 5-6-fidus extus lanatus inter glaber, pedicellatus, laciniis linearibus acutis, corollæ persistentis tubo exserto flavido-virescenti, corollæ labio superiore subbifido sinu *cyaneo* punctato, inferiore 4-partito la-

ciniis ovatis obtusis cyaneis, staminibus 4 didynamis *inclusis* posticis anticos superantibus filamentis brevibus antheris unilocularibus rima transversa dehiscentibus. Pollen rima unica. Discus floralis in appendiculum globosum lateralem productus. Nuculis 4. — Foliis floralibus 3-5 lobatis vel inæqualiter plurilobatis dentatis. — In reg. Olympiæ Lepetymniæque. — C.

Teucrium Scordium L.

T. scordioides Schreb.

T. Chamædrys L. — In reg. Olympiæ. — C.

T. pannonicum Kern. β . **pauciflorum**. — Calyx major virescens haud rubescens, capitula 2-6-flora, floribus laxis ochroleucis. — In regione Olympiæ.

T. Polium L. (*T. Polium* var. α . Boiss.). — In pinetis. — CC.

— forma *tomentosior*. — Deest, hanc formam in Lycabeto Athenarum observavi.

T. capitatum L. (*T. Polium angustifolium* Bth.). — Deest, sed magnam copiam ejus in St. Stephano Byzantii observavi.

Heliotropium supinum L. — In urbe Mitylene.

H. tenuiflorum Guss. β . **leiocarpum**. — C.

— γ . **rotundifolium**. — C.

H. pycnanthum. — C.

CONSPECTUS DIAGNOSTICUS

H. europæi, *H. tenuiflori* et *H. pycnanthi* :

- I. Foliis ellipticis, stigmatе elongato-conico basi tenuissime puberula, cæterum glabro (confer *H. tenuifl.*) stylum glabrum brevem superanti.
 - α . Nuculæ glabræ vel parce hispidulæ, corolla major limbo patulo.
..... H. EUROPEUM L.
 - β . Magis canescens, corollæ limbus minor erectiusculus nec patulus, sinuum dentibus majoribus, stigma magis pubescens.....
..... H. TENUIFLORUM Guss.
- II. Foliis oblongis, stylo brevissime glabro, stigma elongato-conium glabrum, spicæ remotæ incomplete 2-seriales.

Nuculæ glabræ, corolla minor limbo erectiusculo sinuum dentibus subnullis, lobis rotundatis obsita, antheris in tubi parte inferiore sitis, nucula glabra. Spicæ 1-4.. H. TENUIFLORUM β . LEIOCARPUM.

III. Foliis *ovatis* vel *orbiculatis*, stylo brevi glabro vel piloso, stigmatе piloso conico breviter elongato basi latius disciformis; spicis remotis incomplete biserialibus.

Sinum dentibus corollinis minutis distinctis, nuculis glabris, cætera præcedentis. *Heliotropium tenuiflorum* var. ROTUNDIFOLIUM.

IV. Foliis ellipticis, stylo brevissimo glabro, stigmatе elongato conico parce piloso vel glabro, spicis 2-5 densifloris distincte biserialibus.

Nuculæ glabræ, corolla minor limbo erectiusculo lobis non rotundatis sed obovatis. Sinum dentibus nullis..... H. PYCNANTHUM.

Heliotropium villosum Willd. var. **trichostigma** mihi, forma α . **rotundifolia**. — Foliis ovato-orbiculatis, caulibus plerumque prostratis aut decumbentibus raro centrali erecto; stigmatе pileiformi obtuso convexo hirto haud conico. — C.

forma β . **oblongifolia**, foliis oblongis. — C.

H. villosum Willd., *trichostigma* P. Candargy, subvar. **meganthum**. — Viride subvillosum, caulibus brevibus erectis simplicibus, foliis oblongis, spicis solitariis brevibus, corollæ tubo calyce 1 1/2-2-plo longiore limbo 10-12 mill. amplo lobis nervosis, stylo brevi glabro, stigmatе depresso pileiformi hispido, nuculis verrucosotuberculatis. — R.

H. rotundifolium Sieb. — RR.

Anchusa italica Retz (= *paniculata* Ait.). — RR.

A. stylosa M. B. var. **brachystyla** (*A. thessala*? B. et Srt.). — Stylo calyce fructifero breviorе, corollæ cæruleæ tubo calyci æquilongo, nuculis ovato-oblongis vel oblongis rectis apice subobliquis minute tuberculatis longitudinaliterque rugosis. — In colle Udja, promontorio Machæra.

Echium hispidum Fl. Gr. var. **pyncocarpum**. — Spicis fructiferis valde acutis elongatis calycibus densis haud laxis patulis vel diffusis vel rarius fere divergentibus. Spicis ante et sub anthesin flavido-hispidis. — C.

Myosotis sicula Guss. — Ad Micra-Limni.

M. intermedia Link. — Mons Palæo-Kastron, campus Ipios, Karini.

Asperugo procumbens L. — In promontorio Machæra.

(A suivre.)